

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО  
ПРИМЕНЕНИЯ  
**ЭМОКСИПИН®**

**Регистрационный номер:** P N002186/02

**Торговое название:** Эмоксипин®

**МНН или группировочное название:** Метилэтилпиридинол.

**Химическое название:** 3-Окси-6-метил-2-этилпиридина гидрохлорид

**Лекарственная форма:** Капли глазные.

**Состав:** 1 мл раствора содержит:

*Активное вещество:* 10 мг метилэтилпиридинола гидрохлорид (эмоксипин)

*вспомогательные вещества:* натрия сульфит безводный, натрия бензоат, калия дигидрофосфат, натрия гидрофосфата додекагидрат, метилцеллюлоза, вода для инъекций.

**Описание:** Бесцветная или слабоокрашенная слегка опалесцирующая жидкость.

**Фармакотерапевтическая группа:** Антиоксидантное средство.

**Код АТХ:** [C05CX]

**Фармакологические свойства:**

Эмоксипин снижает проницаемость капилляров, укрепляет сосудистую стенку, стабилизирует мембрану клетки, тормозит агрегацию тромбоцитов, уменьшает свертываемость и вязкость крови, обладает антиагрегационным и антигипоксическим действием.

*Фармакокинетика:* Препарат быстро проникает в ткани глаза (даже в условиях отека тканей и нарушенного кровоснабжения), где происходит его депонирование и метаболизм. Обнаружено 5 метаболитов эмоксипина, представленных дезалкилированными и конъюгированными продуктами его превращения. Связывается с белками плазмы крови в среднем на 42 %.

**Показания к применению:**

- лечение и профилактика воспалений и ожогов роговицы;
- лечение кровоизлияний в переднюю камеру глаза;
- лечение осложнений при близорукости;
- защита роговицы при ношении контактных линз;
- профилактика и лечение кровоизлияний в склере у лиц пожилого возраста.

**Противопоказания:**

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность и период лактации, детский возраст до 18 лет.

**Способ применения и дозы:**


Препарат закапывают в конъюнктивальную полость по 1-2 капли 2-3 раза в день. Курс лечения 3-30 дней. При необходимости и хорошей переносимости препарата курс лечения может быть продлен до 6 месяцев или повторяться 2-

3 раза в год.

**Способ применения и дозы:**

Препарат закапывают в конъюнктивальную полость по 1-2 капли 2-3 раза в день. Курс лечения 3-30 дней. При необходимости и хорошей переносимости препарата курс лечения может быть продлен до 6 месяцев или повторяться 2-3 раза в год.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КРЫШКИ-КАПЕЛЬНИЦЫ**



1. Снять с флакона алюминиевый колпачок и резиновую пробку.
2. Надеть на флакон полиэтиленовую крышку-капельницу, которая прилагается к флакону, предварительно сняв с нее упаковку.
3. Перевернуть флакон вверх дном и закапать капли, нажав на корпус крышки-капельницы.
4. Закрыть крышку-капельницу маленьким колпачком, надорвав три перепонки в нижней части крышки-капельницы.

**Побочное действие:**

Возможно ощущение жжения, зуда; кратковременная гиперемия конъюнктивы, редко – развитие местных аллергических реакций.

**Передозировка:**

Не описана.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Раствор эмоксипина не следует смешивать с другими лекарственными растворами.

**Особые указания:**

Пипетку перед применением промыть свежeproкипяченной водой.

При необходимости одновременного использования других капель эмоксипин следует закапывать последним, после полного всасывания предшествующих капель (не менее чем через 10-15 минут).

**Форма выпуска:**

Капли глазные 1% раствор во флаконах по 5 мл. Каждый флакон вместе с пипеткой или крышкой-капельницей и инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

**Условия хранения:**

В защищенном от света месте.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности:**

2 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска из аптек:**

По рецепту.

**Наименование и адрес юридического лица, на имя которого выдано регистрационное удостоверение/организация принимающая претензии:**

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИТ ФАРМ», 123154, г. Москва, бульвар Генерала Карбышева, дом 8, стр. 4.

Тел.: (495) 664-27-89.

**Наименование и адрес производителя лекарственного препарата и адрес места производства лекарственного препарата:**

ООО Фирма «ФЕРМЕНТ», 143422, Московская область, Красногорский район, с. Петрово-Дальнее, «Биомед» им. Мечникова.

Тел./факс: (495) 635-00-28.