

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
Эмоксипин®

Регистрационный номер: P N002186/02

Торговое название: Эмоксипин®

МНН или группировочное название: Метилэтилпиридинол.

Лекарственная форма: Капли глазные.

Состав: 1 мл раствора содержит:

Действующее вещество: 10 мг метилэтилпиридинола гидрохлорид (эмоксипин).

Вспомогательные вещества: натрия сульфит безводный, натрия бензоат, калия дигидрофосфат, натрия гидрофосфата додекагидрат, метилцеллюлоза, вода для инъекций.

Описание: Бесцветная или слабоокрашенная слегка опалесцирующая жидкость.

Фармакотерапевтическая группа: Антиоксидантное средство.

Код АТХ: [C05CX]

Фармакологические свойства:

Эмоксипин снижает проницаемость капилляров, укрепляет сосудистую стенку, стабилизирует мембрану клетки, тормозит агрегацию тромбоцитов, уменьшает свертываемость и вязкость крови, обладает антиагрегационным и антигипоксическим действием.

Фармакокинетика: Препарат быстро проникает в ткани глаза (даже в условиях отека тканей и нарушенного кровоснабжения), где происходит его депонирование и метаболизм. Обнаружено 5 метаболитов эмоксипина, представленных дезалкилированными и конъюгированными продуктами его превращения. Связывается с белками плазмы крови в среднем на 42 %.

Показания к применению

- лечение и профилактика воспалений и ожогов роговицы;
- лечение и профилактика кровоизлияний в переднюю камеру глаза;
- лечение и профилактика кровоизлияний в склеру у лиц пожилого возраста;
- лечение и профилактика тромбоза центральной вены сетчатки и ее ветвей;
- лечение и профилактика осложнений близорукости;
- защита роговицы при ношении контактных линз;
- лечение и профилактика диабетической ретинопатии.

Противопоказания:

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность и период лактации, детский возраст до 18 лет.

Способ применения и дозы

Препарат закапывают в конъюнктивальную полость по 1-2 капли 2-3 раза в день. Курс лечения 3-30 дней. При необходимости и хорошей переносимости препарата курс лечения может быть продлен до 6 месяцев или повторяться 2-3 раза в год.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КРЫШКИ-КАПЕЛЬНИЦЫ



1. Снять с флакона алюминиевый колпачок и резиновую пробку.
2. Надеть на флакон полиэтиленовую крышку-капельницу, которая прилагается к флакону, предварительно сняв с нее упаковку.
3. Перевернуть флакон вверх дном и закапать капли, нажав на корпус крышки-капельницы.
4. Закрыть крышку-капельницу маленьким колпачком, надорвав три перепонки в нижней части крышки-капельницы.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



1. Удерживая флакон в руке, взяться за пластиковую крышку со стороны двух стрелок, которые расположены на алюминиевом колпачке и направлены к центру колпачка.
2. Плавно потянуть вверх до отрыва лепестка с пластиковой крышкой.
- 3-4. Потянуть вбок до полного снятия пластиковой крышки с алюминиевым колпачком.
5. Надеть на флакон полиэтиленовую крышку-капельницу, которая прилагается к флакону, предварительно сняв с нее упаковку.
6. Перевернуть флакон вверх дном и закапать капли, нажав на корпус крышки-капельницы.
7. Закрыть крышку-капельницу маленьким колпачком, надорвав три перепонки в нижней части крышки-капельницы.

Побочное действие: Возможно ощущение жжения, зуда; кратковременная гиперемия конъюнктивы, редко – развитие местных аллергических реакций.

Передозировка: Не описана.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами: Раствор эмоксипина не следует смешивать с другими лекарственными растворами.

Особые указания: Пипетку перед применением промыть свежeproкипяченной водой. При необходимости одновременного использования других капель эмоксипин следует закапывать последним, после полного всасывания предшествующих капель (не менее чем через 10-15 минут).

Форма выпуска: Капли глазные, 1%

По 5 мл в бесцветные стеклянные флаконы, закупоренные резиновыми пробками, завальцованные алюминиевыми колпачками или комбинированными колпачками типа «флип-офф». Один флакон с пипеткой или крышкой – капельницей и инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения: В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности 3 года. После вскрытия флакона – 1 месяц. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек: По рецепту.

Наименование и адрес юридического лица, на имя которого выдано регистрационное удостоверение/организация, принимающая претензии:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭМОКСИФАРМ" (АО "ЭМОКСИФАРМ"), Россия, 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, эт. 24, пом. I, ком. 411

Наименование и адрес производителя лекарственного препарата и адрес места производства лекарственного препарата:

Общество с ограниченной ответственностью Фирма «ФЕРМЕНТ» (ООО Фирма «ФЕРМЕНТ»), Россия, Московская обл., г.о. Красногорск, пос. Мечниково, владение 11, стр. 1. Тел./факс: (495) 635-00-28.